



Consiglio Regionale del Piemonte

Circolare informativa n. 26/2019

Torino, 25 Ottobre 2019

**AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE**

**ISCRITTI E NON ISCRITTI AL SINDACATO**

Cara/o Collega,

anche quest'anno è partita la campagna di vaccinazione anti influenzale. Possiamo offrire gratuitamente presso i nostri studi la vaccinazione antinfluenzale a tutti i soggetti che, a causa del proprio stato di salute, si trovano in condizioni di maggior rischio. Si tratta dei soggetti con età maggiore o uguale a 65 anni e delle persone, tra i 6 mesi e 64 anni, che soffrono di malattie croniche che, in caso di influenza, possono sviluppare gravi complicazioni.

Ti ricordo inoltre che **dal 2017** possiamo offrire gratuitamente nei nostri studi anche la vaccinazione anti-pneumococco (protezione per polmonite, meningite e sepsi) ed anti herpes zoster (protezione contro il fuoco di Sant'Antonio) ai soggetti di 65 anni (ai nati nel 1952, 1953 e 1954). **A differenza di quella antinfluenzale (che è stagionale) le vaccinazioni per Pneumococco e per Herpes Zoster possono essere somministrate durante tutto l'anno.** Purtroppo come avrai appreso partecipando a

uno dei numerosi corsi di formazione “sulle vaccinazioni”, che FIMMG ha organizzato insieme al settore Prevenzione/Vaccinazioni della Regione Piemonte e portato in tutte le province, siamo ben lontani dalle coperture richieste dal Piano Nazionale Vaccini per Influenza, Pneumococco e Zoster.

L'entusiasmo dimostrato e la partecipazione dovunque superiore ad ogni aspettativa all'offerta formativa, conferma la convinta consapevolezza della Medicina Generale verso le vaccinazioni in particolare quelle dell'età adulta.

Dobbiamo essere consapevoli, però, che ciò non sarà sufficiente per confermare la nostra credibilità e accrescere in futuro il nostro ruolo nella tutela della salute pubblica se non riusciremo, con l'impegno di tutti, a migliorare in modo sensibile le coperture delle vaccinazioni: **Antinfluenzale, Antipneumococcica ed Anti Herpes Zoster.**

Buone vaccinazioni a tutti!

Cordiali saluti

Il Segretario Regionale FIMMG del Piemonte

Dr. Roberto Venesia

**In allegato trovi le informazioni che ti saranno utili**

Il 28 ottobre partirà la campagna di vaccinazione anti influenzale.

Ricordiamoci che:

### VACCINO ANTINFLUENZALE

- I MMG possono rivolgersi presso qualsiasi farmacia del Piemonte per la prenotazione e il successivo ritiro.
- Il vaccino antinfluenzale disponibile per la prossima campagna di vaccinazione 2019-2020 è il **VAXIGRIP TETRA** (inattivato **tetravalente**). Per singolo medico, la quota di vaccino che è possibile ordinare con la prima prenotazione non può superare il **50% delle dosi somministrate** durante la precedente stagione (2018-2019).
- I MMG da poco inseriti negli elenchi potranno ritirare un numero di dosi non superiore alle **80 unità**.
- La seconda tranche potrà essere prenotata e ritirata quando almeno il 50% delle dosi ritirate con la prima tranche saranno registrate sul portale dedicato.
- La terza tranche potrà essere prenotata e ritirata solo quando almeno l'80% delle dosi ritirate in precedenza saranno registrate sul portale dedicato.

Al fine di evitare inutili sprechi di vaccini, verso il termine della campagna di vaccinazione, possiamo effettuare uno scambio di dosi di vaccino tra di noi medici di famiglia

Sul portale della salute SISTEMA PIEMONTE, è stata creata una sezione, distinta per singola ASL, dedicata allo scambio dei vaccini.

### Vacciniamo gli over 65 ma ricordiamoci dei pazienti a RISCHIO, prima di iniziare consultiamo l'elenco delle patologie a rischio

---

#### **Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza:**

---

- Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza.
  - Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza:
    - a) *malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma grave, la displasia broncopulmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);*
    - b) *malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;*
    - c) *diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI >30);*
    - d) *insufficienza renale/surrenale cronica;*
    - e) *malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;*
    - f) *tumori;*
    - g) *malattie congenite o acquisite che comportino carenza produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;*
    - h) *malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;*
    - i) *patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;*
    - j) *patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari);*
    - k) *epatopatie croniche.*
  - Soggetti di età pari o superiore a 65 anni.
  - Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale.
  - Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti.
  - Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato).
-

<b>Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Medici e personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l'influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali.</li> <li>- Forze di polizia</li> <li>- Vigili del fuoco</li> <li>- Altre categorie socialmente utili potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa; a tale riguardo, è facoltà delle Regioni/PP.AA. definire i principi e le modalità dell'offerta a tali categorie.</li> <li>- Infine, è pratica internazionalmente diffusa l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori particolarmente esposti per attività svolta e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività.</li> </ul>
<b>Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allevatori</li> <li>- Addetti all'attività di allevamento</li> <li>- Addetti al trasporto di animali vivi</li> <li>- Macellatori e vaccinatori</li> <li>- Veterinari pubblici e libero-professionisti</li> </ul>
<b>Altre categorie</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Donatori di sangue</li> </ul>

## VACCINO PNEUMOCOCCICO

Il ciclo è composto da:

Una dose di vaccino pneumococcico coniugato 13-valente (Prevenar 13) nel muscolo deltoide.

Una dose di vaccino pneumococcico polisaccaridico 23-valente (Pneumovax) a distanza di almeno 12 mesi dalla dose di Prevenar 13 nel muscolo deltoide

**NB:** se per errore viene effettuata prima la dose di vaccino pneumococcico polisaccaridico 23-valente (Pneumovax), si dovrà attendere almeno 1 anno prima di effettuare la dose di vaccino pneumococcico coniugato 13-valente (Prevenar 13).

Nel 2019 i soggetti che possono essere vaccinati gratuitamente da noi MdF nei i nostri ambulatori sono:

- i nati nel 1952, 1953, 1954 e dal 2020 i nati nel 1955. Ritireremo **10 dosi** per ogni approvvigionamento solo dopo aver registrato l'80% delle dosi effettuate

**Di seguito le categorie a rischio che il MMG individuandole, dovrà inviare ai servizi di igiene pubblica per la vaccinazione:**

1. Alcoolismo cronico
2. Asplenia anatomica o funzionale
3. Cardiopatie croniche
4. Deficit fattori del complemento
5. Diabete mellito
6. Malattie polmonari croniche

7. Emoglobinopatie
8. Epatopatie croniche gravi
9. Immunodeficienze congenite o acquisite (Leucemie, linfomi, mieloma multiplo, Neoplasie diffuse, Trapianto d'organo o di midollo, soggetti sottoposti a chemioterapia o a radioterapia o a trattamenti immunosoppressivi)
10. Infezione da HIV
11. Insufficienza renale/surrenale cronica
12. Soggetti con perdite liquorali da traumi o intervento
13. Portatori di impianto cocleare

PCV13 e PS23 possono essere somministrati in concomitanza con il vaccino ANTINFLUENZALE e con il vaccino per l'HERPES ZOSTER

### VACCINO ANTI ZOSTER

Possiamo vaccinare i pazienti nati nel 1952, 1953, 1954 e dal 2020 i pazienti nati nel 1955. Ritirare **10 dosi** per ogni approvvigionamento solo dopo aver registrato l'80% delle dosi effettuate

E' nostro compito consigliare di effettuare la vaccinazione presso i centri vaccinali ASL a partire dai 50 anni ai pazienti affetti da:

- Diabete mellito**
- Patologie cardiovascolare**
- BPCO**
- Soggetti destinati a terapia immunosoppressiva e in attesa di trapianto**

La vaccinazione in questi casi, viene offerta gratuitamente presso i servizi vaccinali delle ASL di competenza

E' possibile la co-somministrazione con vaccini anti-influenzali ed anti-pneumococcici

Per tutti coloro che rientrano tra le condizioni a rischio elevato di infezione invasiva indipendentemente dall'età e che, secondo il PNPV, hanno diritto ad essere vaccinati presso i servizi vaccinali delle ASL (ma che per le loro condizioni di salute non possono accedervi) potranno essere vaccinati al domicilio dal proprio medico di famiglia

richiedendo la dose di vaccino anti Pneumococcico e anti HZ in farmacia con le consuete modalità e registrando l'avvenuta vaccinazione sul PORTALE (selezionando nella tendina dell'età il termine "QUALSIASI").

Con il contributo dei Dottori Paolo Morato e Ruggero Fassone