

FIMMGTO-NOTIZIE

Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato dei Medici di Medicina Generale

LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione e Aldo Mozzone

Caro Collega,

Gli Stent medicati, come sai, sono ad altissimo rischio di embolizzazione; per questo motivo è spesso necessario prolungare la doppia antiaggregazione con Clopidogrel ed aspirina. Il Piano terapeutico per la doppia antiaggregazione prevede una durata di concedibilità a carico del SSN del Plavix per soli 6 mesi.

Il Direttore del Servizio Farmaceutico della ASL 3, su input del Direttore del Dipartimento di Cardiologia che ha posto il problema alla Commissione per l'Appropriatezza, ha richiesto il parere dell' AIFA. Ti alleghiamo la risposta AIFA che concede il prolungamento della terapia ad 1 anno.

L' aforisma de "L' INCONTRO":

**"L' esperienza è un biglietto della lotteria comprato dopo l' estrazione" –
GABRIEL MISTRAL**



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

AIFA

Direttore Generale:

Dott. Nello Martini

Prot. 35624/l.8.f.e

Roma, 03/04/2007

Direttore Ufficio

Informazione e

Comunicazione:

Dott. Antonio Addis

Dott.ssa Anna Leggieri

E-mail: leggieri@asl3.to.it

FARMACI-line

Coordinatore:

Dott.ssa Rina Di Pasquale

Gent.ma Dott.ssa Leggieri,

in merito alla richiesta di informazioni da Lei inoltrata, si precisa quanto segue:

Responsabile

FARMACI-line Network:

Dott.ssa Elena Matarangolo

Il piano terapeutico introdotto con le recenti revisioni delle note AIFA, prevede, nei pazienti sottoposti ad angioplastica percutanea con applicazione di stent medicato, che il trattamento con clopidogrel in associazione con ASA, sia della durata di 6 mesi(1,2). Infatti, la terapia basata sulla doppia antiaggregazione è fondamentale per prevenire la trombosi dello stent.

Staff Operativo:

Dott. E. Donnarumma

Dott.ssa I. Pagano

Dott.ssa P. Vaccaro

Dott.ssa M. De Lorenzis

Tale evento, che si manifesta con infarto miocardico acuto spesso fatale, rappresenta il principale effetto avverso legato alla sospensione, specie se prematura, del trattamento farmacologico.

Pertanto, quando nel paziente sono presenti uno o più fattori predittivi di tipo clinico (età avanzata, diabete, insufficienza renale, frazione di eiezione ridotta, etc) e angiografico (stents lunghi, lesioni multiple, stents sovrapposti, vasi di piccolo calibro, etc), si deve prendere in considerazione di prolungare il trattamento con ASA e clopidogrel almeno fino a 12 mesi, se il paziente è a basso rischio di sanguinamento(3).

Rimaniamo a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti e Le porgiamo distinti saluti.

A.A.

SERVIZIO FARMACI-Line

Dott. Meri De Lorenzis

Ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", vi informiamo che i dati acquisiti con riferimento al servizio di informazione sul farmaco richiesto saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati. I dati inerenti il trattamento potranno essere comunicati, sempre ai fini del servizio in oggetto, al Ministero della Salute e all' Agenzia Italiana del Farmaco. Le rendiamo noto che, in ogni caso, le disposizioni legislative del Codice in materia di protezione dei dati personali le permettono di accedere, cancellare o modificare i suoi dati in qualsiasi momento. (Titolare del trattamento: Evidentia Medica Srl; Responsabile del trattamento: Rina di Pasquale. Fax: 06/59784147 – e-mail: farmaci@farmaci-line.it).